

非小細胞肺癌に対する CDDP+TS-1療法(長崎大トライアル用)

(シスプラチン+TS-1)

)RPHW_D RPHW_1

2011年12月26日 作成

2014年09月10日 改訂(第6版)

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル		【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()	コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製 ☐ 有 ☐ 無		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用		

Day1(/) ~ Day14(/)

《治療当日の朝より服用開始》

ティーエスワンカプセル

★1日量 mg


を1日2回に分けて、14日間服用

【ティーエスワン初回基準1回量】


体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

※適宜増減

Day8(/)



Day9(/) ~ Day10(/)



【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

◇蓄尿 Day8(/) ~ Day10(/)

16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+TS-1療法

標準投与量:

CDDP	60 mg/m ²	day1
TS-1	80 mg/m ²	day1-14
		4週毎