

## 胸腺腫瘍に対する CDDP+PTX療法

(シスプラチン+パクリタキセル)

)RPHW\_D RPHW\_I

2012年02月14日 承認

2019年09月25日 改訂(第7版)

Dr.sign

/

Ns.sign


Ph.sign

|          |               |                 |                |    |    |                |
|----------|---------------|-----------------|----------------|----|----|----------------|
| 病棟・科名    | 登録番号          | 氏名              | 年齢             | 身長 | 体重 | 体表面積           |
|          | <<SYPID>>     | <<ORIBP_KANJI>> | 様 <<SYAGE>>    | cm | kg | m <sup>2</sup> |
| 疾患名      | 施行予定日         | 実施サイクル          | 【調製指示】         |    |    |                |
|          | 月 日 ~ ( )コース目 | コース予定           | □調製可 □TEL連絡後調製 |    |    |                |
| アルコール過敏症 | 備考[標準投与量逸脱など] | 放射線併用           |                |    |    |                |
| □なし □あり  |               | □有 □無           |                |    |    |                |

Day1( / )


※初回のみモニタを装着すること!!

本管



Day2( / ) ~ Day3( / )

本管



## 【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時  
(1) ナウゼリン坐薬 60mg  
(2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時  
(1) プリンペラン1A iv  
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始
- ◇蓄尿 Day1( / )~Day3( / )  
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+PTX療法

標準投与量:

|      |                       |      |
|------|-----------------------|------|
| CDDP | 80 mg/m <sup>2</sup>  | day1 |
| PTX  | 180 mg/m <sup>2</sup> | day1 |
|      |                       | 3週毎  |