

## 非小細胞肺癌に対する NDP+DTX療法

(アクプラ+ドセタキセル)

)RPHW\_ )RPHW\_\

2012年04月10日 承認

2019年08月6日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 ⟨⟨SYID⟩⟩	氏名 ⟨⟨ORIBP_KANJI⟩⟩	年齢 様 ⟨⟨SYAGE⟩⟩	身長	体重 cm	体表面積 kg	$m^2$
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( 月 日 )	コース目	実施サイクル	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]						放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

Day1( / )

## 本管

ソルデム3A 500mL

## 側管



## 【指示】

## ◇悪心、嘔吐著明時

- (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
- (2) (1)で無効時、テルペラン錠

## ◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

## NDP+DTX療法

## 標準投与量:

DTX	60 mg/m <sup>2</sup>	day1
NDP	100 mg/m <sup>2</sup>	day1 3週毎