

非小細胞肺癌に対する Bevacizumab+Pemetrexed療法

(アバスチン+アリムタ)

)RPHW_D RPHW_1

2012年07月10日 承認

2014年04月01日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製 ☐ 有 ☐ 無			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			

【必須項目】

- ☐ 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
☐ 初回投与の少なくとも7日前にフレスミンS注 1A筋注

Day1 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

本管

ソルデム3A 200mL

側管

(2hr)

全開で

生理食塩水 50mL

生理食塩水 100mL
アバスチン mg

生理食塩水 50mL
アリムタ mg

(10min)

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

初回 : 90分かけてdiv
↓ (忍耐力良好)
2回目 : 60分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可

Day2 (/) ~ Day3 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【アリムタの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から
22日目まで可能な限り投与する。
 (2) フレスミンS注は、投与期間中および
投与中止後22日目まで
9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Bevacizumab+Pemetrexed療法

標準投与量:

Bev	15 mg/kg	day1
PEM	500 mg/m ²	day1
3週毎		