

## 非小細胞肺癌に対する CBDCA+nab-PTX療法

(カルボプラチン+アブラキサン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2013年04月08日 承認

2020年02月17日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

|               |           |                 |                  |    |    |                |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|----|----|----------------|
| 病棟・科名         | 登録番号      | 氏名              | 年齢               | 身長 | 体重 | 体表面積           |
|               | <<SYPID>> | <<ORIBP_KANJI>> | 様 <<SYAGE>>      | cm | kg | m <sup>2</sup> |
| 疾患名           | 施行予定日     | 実施サイクル          | 【調製指示】           |    |    |                |
|               | 月 日 ~ ( ) | コース目            | □ 調製可 □ TEL連絡後調製 |    |    |                |
| 備考[標準投与量逸脱など] |           |                 | 【調製指示(2回目以降)】    |    |    |                |
|               |           |                 | □ 調製可 □ TEL連絡後調製 |    |    |                |

放射線併用

□ 有 □ 無

Day1 ( / )

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(3hr)

開始時

(15min)

グラニセトロン 1mg/50mL  
デキサート6.6mg 1V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 12mg)

一旦本管止め

アブラキサン mg

(30min)

※主管止めて単独投与

全量  
mL

本管再開

生理食塩水 250mL  
カルボプラチン mg

(1.5hr)

生理食塩水 50mL

全開で

終了抜去

使用Cre値

GFR算出式

mg/dl

□ Cockcroft-Gault

□ 補正あり

□ Jelliffe

□ 補正なし

□ 24hrCcr

□

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

Day8 ( / ) ・ Day15 ( / )

本管

ソルデム3A 200mL

側管

開始時

(10min)

生理食塩水 50mL  
デキサート6.6mg 1V  
(リン酸エステル換算 8mg)

一旦主管止め

アブラキサン mg

(30min)

※主管止めて単ルート  
で投与すること!!

全量  
0mL

本管再開

生理食塩水 50mL

全開で

終了抜去

## 【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

(1) ナウゼリン坐薬 60mg

(2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

(1) プリンペラン1A iv

(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

## 標準投与量:

CBDCA+nab-PTX療法

CBDCA AUC=6

day1

nab-PTX 100 mg/m<sup>2</sup>

day1,8,15

3週毎