化学療法計画書　　□薬剤部提出用　□患者様説明用

非小細胞肺癌に対するWeekly CBDCA＋PTX(+Radiation)療法

（カルボプラチン＋パクリタキセル）　)RPHW_)RPHW_\

2014年03月12日 承認
2020年03月16日（第5版）

Dr.sign　　Ns.sign　　Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m^2

疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示（初日）】
	月　日 ～（　）コース目	コース予定	□調製可 □TEL連絡後調製
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]		【調製指示（2回目以降）】
□なし□あり（慎重投与）			□連投可 □TEL連絡後調製
			放射線併用 □有 □無

Day1（　/　）・Day8（　/　）・Day15（　/　）
Day22（　/　）・Day29（　/　）・Day36（　/　）　Day43（　/　）

※初回のみモニタを装着すること!!

本管

ソルデム3A　500mL

側管

(4hr)

(10min) ← 生理食塩水　50mL
ガスター20mg 1A
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
（リン酸エステル換算　12mg）

(30min) ← グラニセトロンバッグ　50mL/袋

専用ルート (1hr) ← 5%ブドウ糖　250mL
パクリタキセル　　mg

(1hr) ← 生理食塩水　250mL
カルボプラチン　　mg

全開で ← 生理食塩水　50mL

終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	□CockCroft-Gault
□補正あり	□Jelliffe
□補正なし	□24hrCcr
	□

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時
（1） 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
（2） (1)で無効時、テルペラン錠

◇吃逆著明時
（1） プリンペラン1A iv
（2） (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

Weekly CBDCA＋PTX(+Radiation)療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=2	day1,8,15,22,29,36,43
PTX	40 mg/m^2	day1,8,15,22,29,36,43
		6週毎