非小細胞肺癌に対する Bevacizumab + Docetaxel療法

(アバスチン+ドセタキセル)

)RPHW DRPHW \

2015年06月16日 承認 Ph.sign Dr.sign Ns.sign 2016年06月03日 改訂(第3版) 体重 病棟•科名 登録番号 氏名 年齢 身長 体表面積 m^2 <<SYPID>> <<ORIBP KANJI>> 様 <<SYAGE>> cm kg 実施サイクル 疾患名 施行予定日 【調製指示】 月 日 ~()コース目 □調製可 □ TEL連絡後調製 コース予定 備考[標準投与量逸脱など] 放射線併用 □有□無

終了抜去

Day1(本管 ソルデム3A 200mL 側管 (2-3hr) 生理食塩水 50_mL 全開で 初回:90分かけてdiv 生理食塩水 100mL ↓ (忍耐性良好) アバスチン 2回目:60分で投与可 ↓ (忍耐性良好) グラニセトロン 1mg/50mL 以降:30分で投与可 開始時 デキサート6.6mg 1V (15min) (リン酸エステル換算 8mg) 5%ブドウ糖 250mL ドセタキセル mg (1hr) 生理食塩水 50mL 全開で

Bevacizumab+Docetaxel療法

標準投与量: Bev 15 mg/kg day1 Docetaxel 60 _{mg/m²} day1 3-4週毎