

胸腺腫瘍に対する ADOC療法(CDDP+ADM+VCR+CPA)

・スプラチン+ドキソルビシン+オンコビン+エンドキサン) RPHW_I<<ORPHW_W>>

2015年02月16日 承認

2020年02月17日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	□ 調製可 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(day 3, 4)】		
			□ 有 □ 無	□ 調製可 □ TEL連絡後調製		

Day1(/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL

側管

(6 hr)

(30 min)

アロキシ 0.75mg/50ml
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(30 min)

生理食塩水 100mL
ドキソルビシン mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1.5 hr)

マンニトール 300mL

遮光

(2 hr)

生理食塩水 300mL
シスプラチン mg

全量

mL

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へパロック

Day2(/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL

側管

(6 hr)

(30 min)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V

(1.5 hr)

マンニトール 300mL

終了後へパロック

Day3(/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL

側管

(6 hr)

(30 min)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V

(10 min)

生理食塩水 50mL
オンコビン mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1.5 hr)

マンニトール 300mL

Day2は終了後へパロック

Day4(/)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(2 hr)

全開で

生理食塩水 50mL

(30 min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(2 hr)

生理食塩水 500mL
エンドキサン mg

全開で

生理食塩水 50mL

ADOC療法

標準投与量:

CDDP	50 mg/m ²	day1
ADM	40 mg/m ²	day1
VCR	0.6 mg/m ²	day3
CPA	700 mg/m ²	day4 (3週毎)

Day5(/) ~ Day6(/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用