

非小細胞肺癌に対する CBDCA+Pemetrexed+Pembrolizumab療法

(カルボプラチン+アリムタ+キートルーダ) RPHW_DRPHW_1

2019年01月21日 承認
2020年02月17日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

【必須項目】

- 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にフレスミンS注 1A筋注

Day1 (/ /)


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用



【アリムタの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

使用Cre値	GFR算出式
[] mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/> []

CBDCA+PEM+Pembrolizumab療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
PEM 500 mg/m² day1
Pembro 200 mg/body day1
3週毎

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始