

非小細胞肺癌に対する Pemetrexed+Pembrolizumab療法

(アリムタ+キートルーダ)

)RPHW_D RPHW_I

2019年01月21日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	□ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□ 有 □ 無			

【必須項目】

- ☐ 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
☐ 初回投与の少なくとも7日前にフレスミンS注 1A筋注

Day1 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

本管

ソルデム3A 200mL

側管

(2hr)

全開で

生理食塩水 50mL

一旦主管止め

専用ルート

(30min)

 生理食塩水 100mL
 キートルーダ mg

※主管止めて単ルートで投与すること！

本管再開

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

 生理食塩水 50mL
 アリムタ mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【アリムタの投与終了(中止)時の注意事項】

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
 (2) フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Pemetrexed+Pembrolizumab療法

標準投与量:

PEM 500 mg/m² day1

Pembro 200 mg/body day1

3週毎