

小細胞肺癌に対する CBDCA+VP-16+Atezolizumab療法

(カルボプラチン+エトポシド+テセントリク) RPHW_DRPHW_1

2019年09月30日 承認

2020年02月17日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目			☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(4~5hr)

全開で

生理食塩水 50mL

専用ルート

生理食塩水 250mL
テセントリク 1200 mg

全開で

生理食塩水 50mL

(15min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

専用ルート

5%ブドウ糖 500mL
エトポシド mg

(2hr)

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へパロック

初回 : 60分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降 : 30分で投与可
↓

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管

ソルデム3A 200mL

側管

(3hr)

(15min)

生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

専用ルート

5%ブドウ糖 500mL
エトポシド mg

(2hr)

全開で

生理食塩水 50mL

Day2は終了後へパロック

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
(2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+VP-16+Atezolizumab療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=5	day1
VP-16	100mg/n	day1-3
Atezolizumab	1200mg/body	day1
		3週毎