

小細胞肺癌に対する CAE療法(CPA+ADM+VP-16)

(エンドキサン+ドキソルビシン+エトポシド) RPHW DRPHW

2020年02月12日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			□有 □無	□調製可 □TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(5hr)

開始時

(30min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

専用ルート

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL
エトポシド mg

(30min)

生理食塩水 100mL
ドキソルビシン mg

(1.5hr)

生理食塩水 250mL
エンドキサン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へパロック

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 200mL

側管

(3hr)

開始時

(30min)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

専用ルート

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL
エトポシド mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2は終了後へパロック

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
- (2) (1)で無効時、テルペラン錠

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CAE療法(CPA+ADM+VP-16)

標準投与量:

CPA	800 mg/m ²	day1
ADM	50 mg/m ²	day1
VP-16	100 mg/m ²	day1-3
		3-4週毎