

小細胞肺癌に対する CAV療法(CPA+ADM+VCR)

(エンドキサン+ドキソルビシン+オンコビン) RPHW DRPHW

2020年02月17日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(3hr)

開始時

(30min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1A
(リン酸エステル換算 8mg)

(10min)

生理食塩水 50mL
オンコビン mg

(30min)

生理食塩水 100mL
ドキソルビシン mg

(1.5hr)

生理食塩水 250mL
エンドキサン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝食後) 服用

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
(2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CAV療法(CPA+ADM+VCR)

標準投与量:

CPA	800 mg/m ²	day1
ADM	50 mg/m ²	day1
VCR	1.4 mg/m ²	day1
(max:2mg/body)		

3-4週毎