

小細胞肺癌に対する CBDCA+AMR療法

(カルボプラチン+カルセド)

DRPHW_DRPHW_1

2009年12月08日 承認

2020年02月17日 改訂(第13版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管




終了後へパロック

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管



Day2は終了後へパロック

調製後3時間
以内に使用

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 - (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 - プリンペラン1A iv
 - (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始

CBDCA+AMR療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=5	day1
AMR	35 mg/m ²	day1-3
4週毎		