

小細胞肺癌・非小細胞肺癌に対する CBDCA+CPT-11療法

(カルボプラチン+イリノテカン) RPHW_RPHW_1

2008年10月21日 承認

2020年02月17日 改訂(第12版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル		【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目	コース予定		□ 調製可 □ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]		放射線併用		【調製指示(8日目、15日目)】		
		□ 有 □ 無		□ 調製可 □ TEL連絡後調製		

Day1(/ /)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(4-5hr)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(15min)

(1.5hr)

5%ブドウ糖 250mL
イリノテカン mg

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day8(/ /)・Day15(/ /)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(2-3hr)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(15min)

(1.5hr)

5%ブドウ糖 250mL
イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day9(/ /) ~ Day10(/ /)

Day16(/ /) ~ Day17(/ /)

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day2(/ /) ~ Day3(/ /)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
(2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

CBDCA+CPT-11療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
CPT-11 50 mg/m² day1,8,15
4週毎