

非小細胞肺癌に対する CBDCA+DTX療法

(カルボプラチン+ドセタキセル)

)RPHW_D RPHW_1

2009年06月09日 承認

2020年02月17日 改訂(第11版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]						放射線併用
						☐ 有 ☐ 無

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(4-5hr)

開始時

(15min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1V
(リン酸エステル換算 12mg)

(1hr)

5%ブドウ糖 250mL
ドセタキセル mg

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
- (2) (1)で無効時、テルペラン錠

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+DTX療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
DTX 50 mg/m² day1
4週毎