

肺癌に対する CBDCA+PTX療法

(カルボプラチン+パクリタキセル)

)RPHW_D RPHW_1

2008年07月08日 承認
2020年02月17日 改訂(第15版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製 ☐ 調製不可			
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用				
☐ なし ☐ あり(慎重投与)		☐ 有 ☐ 無				

※初回のみモニタを装着すること!!

Day1(/ /)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(6hr)

開始時
(10min)

生理食塩水 50mL
 ガスター20mg 1A
 ポララミン 1A
 デキサート6.6mg 2V
 デキサート3.3mg 1A
 (リン酸エステル換算 20mg)

開始時
(30min)

グラニセトロン 1mg/50mL

専用ルート
(3hr)

5%ブドウ糖 500mL
 パクリタキセル mg

(1hr)

生理食塩水 250mL
 カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2(/ /) ~ Day3(/ /)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 (1) プリンペラン1A iv
 (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

CBDCA+PTX療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
 PTX 180 mg/m² day1
 4週毎