

非小細胞肺癌に対する CBDCA+VNR療法

(カルボプラチン+ロゼウス)

)RPHW_D RPHW_I

2009年07月14日 承認
2020年02月17日 改訂(第12版)

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(Day8)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500mL 側管

(4-5h)

(15min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(10min)

生理食塩水 50mL
ロゼウス mg

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day8 (/)

本管

ソルデム3A 200mL 側管

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL
ロゼウス mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) ナウゼリン坐薬 60mg
(2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+VNR療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=5	day1
VNR	25 mg/m ²	day1,8
4週毎		