

小細胞肺癌・非小細胞肺癌に対する CDDP+CPT-11療法

(シスプラチン+イリノテカン) RPHW_RPHW_1

2009年05月08日 承認
2014年09月10日 改訂(第11版)

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目			☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(8日目、15日目)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1 (/)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(5hr)

開始時

(30min)

 アロキシ点滴バッグ 50mL/袋
 プロイメンド 1V
 デキサート6.6mg 1A
 (リン酸エステル換算 8mg)

(1.5hr)

 5%ブドウ糖 250mL
 イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1.5hr)

マンニトール 300mL

遮光

(2hr)

 生理食塩水 300mL
 シスプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

全量

mL

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

ビカネイト 1000mL

(3hr)

終了後へパロック

Day2 (/) ~ Day3 (/)

本管

ビカネイト 1000mL

(3hr)

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

(1.5hr)

マンニトール 300mL

Day2は終了後へパロック

Day8 (/) ・ Day15 (/)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(2-3hr)

開始時

(30min)

 アロキシ点滴バッグ 50mL/袋
 デキサート3.3mg 1V
 (リン酸エステル換算 4mg)

(1.5hr)

 5%ブドウ糖 250mL
 イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へ抜去

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始

◇蓄尿 Day1 (/) ~ Day3 (/)

16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+CPT-11療法

標準投与量:

CDDP	60-80 mg/m ²	day1
CPT-11	60 mg/m ²	day1,8,15
4週毎		