

## 非小細胞肺癌に対する CDDP+TS-1療法

(シスプラチナ+S-1)

ORPHW\_ORPHW\_

2019年09月30日 改訂(第10版)

Dr.sign


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積			
	<<SYID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>		cm	kg			
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】						
	月 日 ~ ( )	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用						
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無						

Day1( / )

## 本管



Day1( / ) ~ Day14( / )

## 《治療当日の朝より服用開始》

## エスワンタイホウ

★1日量 [ ] mg  
を1日2回に分けて、14日間服用


## 【エスワンタイホウ初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

※適宜増減

Day2( / ) ~ Day3( / )

## 本管



Day2は終了後ヘパロック

## 【指示】

## ◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

## ◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

◇蓄尿 Day1( / )~Day3( / )  
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

## CDDP+TS-1療法

## 標準投与量:

CDDP	60 mg/m <sup>2</sup>	day1
S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	day1-14

4週毎