

小細胞肺癌に対する CDDP+VP-16療法

(シスプラチン+エトポシド)

)RPHW_DRPHW_1

2009年10月13日 承認
2014年09月10日 改訂(第13版)

Dr.sign


/

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()	コース目		□調製可 □TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			□有 □無	□調製可 □TEL連絡後調製		

Day1 (/)



Day2 (/) ~ Day3 (/)



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) ナウゼリン坐薬 60mg
(2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始
- ◇蓄尿 Day1 (/) ~ Day3 (/)
16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+VP-16療法

標準投与量:

CDDP	80 mg/m ²	day1
VP-16	100 mg/m ²	day1-3
		3-4週毎