





癌性胸膜炎に対する CDDP胸腔内療法

(シスプラチン)

)RPHW_D RPHW_1

2014年04月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

《胸腔内投与》(遮光)

蒸留水	500mL
シスプラチン	25mg

本管

ソルデム3A 1,500mL

(6hr)

側管

開始時

(30min)

アロキシ点滴バッグ	50mL/袋
デキサート	6.6mg 1V
(リン酸エステル換算)	8mg)

終了後へパロック

Day2 (/) ~ Day3 (/)

本管

ソルデム3A 1,500mL

(6hr)

Day2は終了後へパロック

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

◇蓄尿 Day1 (/) ~ Day3 (/)

16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP胸腔内療法

標準投与量:

CDDP 25 mg/body day1