

非小細胞肺癌に対する GEM療法

(ゲムシタビン)

)RPHW_\RPHW_\

2008年09月09日 承認

2016年06月03日 改訂(第8版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ⟨⟨SYPID⟩⟩	氏名 ⟨⟨ORIBP_KANJI⟩⟩	年齢 様 ⟨⟨SYAGE⟩⟩	身長	体重 cm	体表面積 kg	m^2	
疾患名	施行予定日 月 日 ~ (月)	コース目 コース予定	実施サイクル				【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				【調製指示(Day8,Day15)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製

Day1(/) - Day8(/) - Day15(/)

**【指示】**

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

GEM療法

標準投与量:

GEM	1,000 mg/ m^2	day1,8,15
4週毎(3投1休)		