

# 小細胞肺癌に対する Nogitecan療法

(ハイカムチン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2009年07月14日 承認  
2014年04月01日 改訂(第6版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ( )	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1( / ) ~ Day5( / )



**【指示】**

- ◇悪心、嘔吐著明時
  - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
  - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
  - (1) プリンペラン1A iv
  - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

Nogitecan療法

標準投与量:

Nogitecan 1.0 mg/m<sup>2</sup> day1-5  
4週毎