

肺癌に対する Weekly Paclitaxel療法

(パクリタキセル)

)RPHW_D RPHW_I

2009年06月09日 承認

2019年09月25日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]	【調製指示(8日目、15日目)】				
☐ なし ☐ あり(慎重投与)		☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製				
放射線併用						
☐ 有 ☐ 無						


Day1(/)・Day8(/)・Day15(/)

※初回のみモニタを装着すること!!

本管

ソルデム3A 200mL

側管



【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

- ◇吃逆著明時
- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

weekly Paclitaxel療法

標準投与量:

PTX 80 mg/m² day1,8,15

4週毎(3投1休)