

非小細胞肺癌に対する VNR＋GEM療法

(ロゼウス＋ゲムシタビン)

)RPHW_D RPHW_I

2009年04月14日 承認

2014年04月01日 改訂(第7版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(Day8)】		
			□有 □無	□調製可 □TEL連絡後調製		

Day1(/)・Day8(/)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(2hr)

開始時

(30min)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(10min)

生理食塩水 50mL
ロゼウス mg

(30min)

生理食塩水 100mL
ゲムシタビン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

VNR＋GEM療法

標準投与量:

VNR 25 mg/m² day1,8GEM 1,000 mg/m² day1,8

3-4週毎