

小細胞肺癌に対する VP-16単独療法

(エトポシド)

DRPHW_DRPHW_1

2014年04月01日 改訂(第7版)

Dr.sign


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/) ~ Day3(/)

本管



Day1~Day2は終了後へパロック

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
 - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

VP-16単独療法

標準投与量:

VP-16 100 mg/m² day1-5
4週毎