

# 非小細胞肺癌に対する NDP+AMR療法(臨床試験)

(アクプラ+カルセド)

DRPHW\_DRPHW\_1

2010年06月15日 承認

2020年02月17日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ( )	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / / )

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 1,000mL 側管

(6hr)

開始時

(30min)

グラニセトロン 1mg/50mL  
デキサート6.6mg 1V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 12mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL  
カルセド \_\_\_\_\_ mg

全開で

生理食塩水 50mL

(2hr)

生理食塩水 500mL  
アクプラ \_\_\_\_\_ mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へパロック

Day2 ( / / ) ~ Day3 ( / / )

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

本管

生理食塩水 250mL 側管

(1.5hr)

(30min)

グラニセトロン 1mg/50mL  
デキサート6.6mg 1V  
(リン酸エステル換算 8mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL  
カルセド \_\_\_\_\_ mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2は終了後へパロック

調製後3時間  
以内に使用

## 【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
  - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
  - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
  - (1) プリンペラン1A iv
  - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始
- ◇蓄尿 Day1 ( / / ) ~ Day3 ( / / )
 

16:00までに尿量800mL以下のときラシックス0.5A iv

## NDP+AMR療法

### 標準投与量:

NDP	100 mg/m <sup>2</sup>	day1
AMR	25 mg/m <sup>2</sup>	day1-3
4週毎		