

# 非小細胞肺癌に対する CBDCA+Pemetrexed療法

(カルボプラチン+アリムタ)

DRPHW\_DRPHW\_1

2010年09月05日 承認  
2020年02月17日 改訂(第5版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

**【必須項目】**

- 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にフレスミンS注 1A筋注

Day1 ( / )


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

デカドロン錠 1回 8錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を  
1日2回(朝昼食後) 服用



**【アリムタの投与終了(中止)時の注意事項】**

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

**【指示】**

- ◇悪心、嘔吐著明時
  - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
  - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
  - (1) プリンペラン1A iv
  - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+Pemetrexed療法

**標準投与量:**

CBDCA AUC=5 day1  
PEM 500 mg/m<sup>2</sup> day1  
4週毎