

非小細胞肺癌に対する CBDCA+TS-1療法

(カルボプラチン+S-1)

)RPHW_D RPHW_I

2011年04月12日 承認

2020年02月17日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□有 □無			

Day1(/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 200mL

側管

1.5hr~2hr

(15min)

グラニセトロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

Day1(/) ~ Day14(/)

《治療当日の朝より服用開始》

エスワンタイホウ

★1日量 mg

を1日2回に分けて、14日間服用

【エスワンタイホウ初回基準1日量】

体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	80mg/日
1.25m ² ~1.5m ² 未満	100mg/日
1.5m ² 以上	120mg/日

※適宜増減

Day2(/) ~ Day3(/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後)服用

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
(1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
(2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
(1) プリンペラン1A iv
(2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+S-1療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
S-1 80 mg/m² day1-14
3-4週毎