

小細胞肺癌に対する CDDP+AMR療法

(シスプラチン+カルセド)

)RPHW_DRPHW_1

2011年09月15日 承認

2014年09月10日 改訂(第6版)

Dr.sign

/


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()	コース目		☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		


Day1 (/)

本管

調製後3時間
以内に使用全量
mL

Day2 (/) ~ Day3 (/)

本管



【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3× 開始

◇蓄尿 Day1 (/) ~ Day3 (/)

16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+AMR療法

標準投与量:

CDDP	60 mg/m ²	day1
AMR	40 mg/m ²	day1-3
		3-4週毎