

# 非小細胞肺癌に対する Bevacizumab+CDDP+Pemetrexed療法

(アバチン+シスプラチン+アリムタ)

DRPHW\_DRPHW\_1

2016年02月16日 承認

Dr.sign /

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		


**【必須項目】**

- 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にフレスミンS注 1A筋注


Day1 ( / / )

Day2 ( / / ) ~ Day3 ( / / )

**本管**



**本管**



**【アリムタの投与終了(中止)時の注意事項】**

- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

**【指示】**

- ◇悪心、嘔吐著明時
  - (1) ナウゼリン坐薬 60mg
  - (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv
- ◇吃逆著明時
  - (1) プリンペラン1A iv
  - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

Bevacizumab+CDDP+Pemetrexed療法

**標準投与量:**

Bev	15 mg/kg	day1
CDDP	75 mg/m <sup>2</sup>	day1
PEM	500 mg/m <sup>2</sup>	day1
3週毎		