

非小細胞肺癌に対する CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab療法

(カルボプラチン+アブラキサン+テセントリク) RPHW_DRPHW

2019年12月16日 承認
2020年02月17日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/ /)



Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

**アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用**

**アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用**

**デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後)服用**

Day8 (/ /) ・ Day15 (/ /)



使用Cre値 mg/dl	GFR算出式
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> Jelliffe
	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab療法

標準投与量:

CBDCA	AUC=6	day1
nab-PT	100 mg/m ²	day1.8.15
Atezo	1200 mg/body	day1
		3週毎