

非小細胞肺癌に対する CDDP+DTX(2投2休)(+Radiation)療法

(シスプラチン+ドセタキセル)

)RPHW_DRPHW_1

2014年03月12日 承認
2014年09月10日 第2版

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(day1)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(day8)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day1(/)・Day8(/)

本管

ソルデム3A 500mL

側管

(5hr)

開始時
(30min)

アロキシ点滴バッグ 50mL/袋
プロイメンド 1V
デキサート6.6mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(1hr)

5%ブドウ糖 250mL
ドセタキセル mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1.5hr)

マンニトール 300mL

遮光

(2hr)

生理食塩水 150mL
シスプラチン mg

全量

150 mL

全開で

生理食塩水 50mL

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

ビカネイト 1000mL

(3hr)

終了後へパロック

Day2(/) ~ Day3(/)

Day9(/) ~ Day10(/)

本管

ビカネイト 1000mL

(3hr)

ソルデム3A 500mL

(1.5hr)

(1.5hr)

マンニトール 300mL

Day2は終了後へパロック

【指示】

◇悪心、嘔吐著明時

- (1) ナウゼリン坐薬 60mg
- (2) (1)で無効時、プリンペラン1A iv

◇吃逆著明時

- (1) プリンペラン1A iv
- (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

◇蓄尿 Day1(/) ~ Day3(/)

Day8(/) ~ Day10(/)

16:00までに尿量800mL以下のときフロセミド0.5A iv

CDDP+DTX療法

標準投与量:

CDDP	40 mg/m ²	day1,8
DTX	40 mg/m ²	day1,8
4週毎		