

# CD30陽性ホジキンリンパ腫に対するA-AVd(BV50mg以上)療法

アドセトリス+ダカルバジン+エクザール+ドキシソルビシン) RPHW DRPHW

2018年11月05日 作成  
2022年02月14日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

※BV 50mg以上

Day1( / ) ・ Day15( / )

本管



A-AVd療法

標準投与量:

Brentuximab	1.2 mg/kg	day1,15
ADM	25 mg/m <sup>2</sup>	day1,15
VBL	6 mg/m <sup>2</sup>	day1,15
	(max:10mg/body)	
DTIC	250 mg/m <sup>2</sup>	day1,15

4週毎