

急性リンパ性白血病に対する Blinatumomab(1コース目)療法

(ビーリンサイト)

DRPHW_DRPHW_V

2019年01月10日 作成

Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目以降)】			
			<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			


Day 1 (/) ・ Day 8 (/)

Day 9 (/) ~ Day 28 (/)

ポートフラッシュ




前日からの継続



Day 2 (/) ~ Day 7 (/)

前日からの継続



- ※ 延長チューブ(100cm 1.0mL)を専用ルートと接続。
- ※ ビーリンサイトは単独ルートで。側管禁。
- ※ つなぎ替えは原則AM10時。
- ※ ルートフラッシュ禁。
- ※ シャワー浴時はヘパロック可。
(ルートロック時はヘパロックのみ。生食フラッシュは禁。)
- ※ 1時間以内に再接続。

Blinatumomab(1コース目)療法

標準投与量:

Bw ≥ 45kg	
Blinatumomab	9 μg /body day1-7
Blinatumomab	28 μg /body day8-28
BW < 45kg	
Blinatumomab	5 μg /m ² day1-7
Blinatumomab	15 μg /m ² day8-28