

急性リンパ性白血病に対する Blinatumomab(2コース目以降)療法

(ビーリンサイト)

DRPHW_DRPHW_V

2019年01月10日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day 1 (/)

Day 2 (/) ~ Day 28 (/)

ポートフラッシュ

デキサートとビーリンサイトのルートは各々別にセットすること

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

(30min)

専用ルート
10mL/hr
(24hr)

生理食塩水 270mL
ビーリンサイト μg

※翌日つなぎ替え時残液破棄

前日からの継続

専用ルート
10mL/hr
(24hr)

生理食塩水 270mL
ビーリンサイト μg

※終了時ルート内の残液は破棄。

- ※ 延長チューブ(100cm 1.0mL)を専用ルートと接続。
- ※ ビーリンサイトは単独ルートで。側管禁。
- ※ つなぎ替えは原則AM10時。
- ※ ルートフラッシュ禁。
- ※ シャワー浴時はヘパロック可。
(ルートロック時はヘパロックのみ。生食フラッシュは禁。)
- ※ 1時間以内に再接続。

Blinatumomab(2コース目以降)療法

標準投与量:

Bw ≥ 45kg

Blinatumomab 28 μg/body day1-28

BW < 45kg

Blinatumomab 15 μg/m² day1-28