

大腸癌に対する Bi-weekly CPT-11療法

(イリノテカン)

DRPHW_DRPHW_1

2008年11月11日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|--|---|----------|------------------------|
| 病棟・科名 | 登録番号 《《SYPID》》 | 氏名 《《ORIBP_KANJI》》 | 年齢 様 《《SYAGE》》 | 身長 cm | 体重 kg | 体表面積 m ² |
| 疾患名 | 施行予定日 月 日 ~ () | | 実施サイクル コース目 | 【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |
| 備考[標準投与量逸脱など] | | | 放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |

Day1(/) ・ Day15(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

(側管終了まで維持) 側管

開始時

(15min)

グラニセロン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL
イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2(/) ~ Day3(/)

Day16(/) ~ Day17(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

Bi-weekly CPT-11療法

標準投与量:

CPT-11 150 mg/m² day1,15
4-5週毎