

# 褐色細胞腫に対する CVD療法

(エンドキサン+オンコビン+ダカルバジン) )RPHW\_D)RPHW\_

2016年04月19日 承認  
2022年02月14日 改訂(第3版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 ( / )



Day2 ( / )



※ダカルバジン  
血管痛防止のため、アルミホイールや遮光袋を利用して、点滴経路全般を遮光すること。

CVD療法

標準投与量:

CPA 750 mg/m<sup>2</sup> day1  
 VCR 1.4 mg/m<sup>2</sup> day1  
 (max:2mg/body)  
 DTIC 600 mg/m<sup>2</sup> day1,2

3週毎