

膵癌に対する Onivyde+5FU+I-LV療法

(リポソームイリノテカン+レボホリナート+5-FU)

DRPHW_DRPHW_1

2020年07月20日 承認
2021年09月02日 改訂(第4版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/ /)

Day2(/ /) ~ Day3(/ /)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管

生理食塩水 1000mL

側管

開始時
(15min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(全開でdiv)

生理食塩水 50mL

要遮光
(90min)

生理食塩水 500mL
オニバイド mg

(2hr)

生理食塩水 250mL
レボホリナート mg

(全開でdiv)

生理食塩水 50mL

(46hr)

生理食塩水 460 mL
フルオロウラシル mg
★全量460mLに調製

《治療翌日より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後)服用

生理食塩水

※昨日主管のつなぎ替え

(24hr)

側管

(全開で)

生理食塩水 50mL

5-FU持続点滴終了後

終了抜去

※ オニバイド含む本管には
生食 か 5%ブドウ糖 を使用

Onivyde+5FU+I-LV療法

標準投与量:

Onivyde	70 mg/m ²	day1
I-LV	200 mg/m ²	day1
5-FU	2,400 mg/m ²	(46hr持続)
2週毎		