

肺癌に対する CPT-11+Radiation療法

(イリノテカン)

DRPHW_DRPHW_1

2020年06月2日 改訂(第5版)


Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(Day8以降)】	
					<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1(/) ・ Day8(/) ・ Day15(/)
 Day22(/) ・ Day29(/) ・ Day36(/)



Day2(/) ~ Day3(/) Day9(/) ~ Day10(/)

Day16(/) ~ Day17(/) Day23(/) ~ Day24(/)

Day30(/) ~ Day31(/) Day37(/) ~ Day38(/)

**デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用**

【指示】

- ◇悪心、嘔吐著明時
 - (1) 投与翌日、翌々日 グラニセトロンゼリー
 - (2) (1)で無効時、テルペラン錠
- ◇吃逆著明時
 - (1) プリンペラン1A iv
 - (2) (1)で無効時、ランドセン 1.5mg 3×開始

CPT-11+RT療法

標準投与量:	day1,8,15
CPT-11	60 mg/m ² day22,29,36
	6週毎