

膵癌に対する Onivyde+5FU+I-LV療法【入院CVport】

(リポソームイリノテカン+レボホリナート+5-FU)

DRPHW_DRPHW_1

2020年07月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 (/)

Day2 (/) ~ Day3 (/)

**アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用**

《治療翌日より2日間服用》

**アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用**


本管(中心静脈ポート)

ルート確保後、主管は止めること

生理食塩水 100mL

側管

**デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後)服用**



終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、自己抜針してもらう)

Onivyde+5FU+I-LV療法

標準投与量:

Onivyde	70 mg/m ²	day1
I-LV	200 mg/m ²	day1
5-FU	2,400 mg/m ²	(46hr持続)
2週毎		