

# 多発性骨髄腫に対する IsaPd療法【74歳以下】(1コース目)

(サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_V

2020年8月31日 承認  
2021年12月22日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

## 内服薬

ポマリストカプセル

★1日 mg

21日間 服用

### 【Dr必須項目】


- サークリサ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡

Day1( / ) Day8( / ) Day15( / ) Day22( / )

## 《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg (過敏反応防止の為)

### 本管



←サークリサの本管には生食かブドウ糖液を使用

### 側管

(30min)  
生理食塩水 100mL  
ガスター20mg 1A  
ポララミン5mg 1A  
デキサート6.6mg 5V  
(リン酸エステル換算 40mg)

専用ルート  
※

生理食塩水 250 mL  
サークリサ mg

全開で

生理食塩水 50mL

day1

### ※サークリサ投与速度

0-1時間  
↓ ( ) mL/hr  
1時間-1時間30分  
↓ ( ) mL/hr  
以後30分毎2時間で速度調整  
↓ ( ) mL/hr

day8.15.22

### ※サークリサ投与速度

0-1時間  
↓ ( ) mL/hr  
1時間-1時間30分  
↓ ( ) mL/hr  
以後30分毎2時間で速度調整  
↓ ( ) mL/hr

IsaPd療法(1コース目)

### 標準投与量:

Isatuximab 10 mg/kg day 1.8.15.22  
Dexa 40 mg/body day 1.8.15.22  
Pomalido 4 mg/body day1-21  
4週毎