

多発性骨髄腫に対する IsaPd療法【75歳以上】(1コース目)

(サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_V

2020年8月31日 承認
2021年12月22日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

ポマリストカプセル

★1日 mg
21日間 服用

【Dr必須項目】

- サークリサ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡

Day1(/) Day8(/) Day15(/) Day22(/)


《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg (過敏反応防止の為)

本管

側管

←サークリサの本管には生食かブドウ糖液を使用



day1

※サークリサ投与速度

0-1時間
↓ () mL/hr
1時間-1時間30分
↓ () mL/hr
以後30分毎2時間で速度調整
↓ () mL/hr

day8.15.22

※サークリサ投与速度

0-1時間
↓ () mL/hr
1時間-1時間30分
↓ () mL/hr
以後30分毎2時間で速度調整
↓ () mL/hr

IsaPd療法(1コース目)

標準投与量:

Isatuximab 10 mg/kg day 1.8.15.22
Dexa 20 mg/body day 1.8.15.22
Pomalido 4 mg/body day1-21
4週毎