

乳癌に対する CMF療法(5-FU+MTX+CPA)

(フルオロウラシル+メソトレキセート+エンドキサン))RPHW_D)RPHW_)

2015年05月19日 承認
2021年04月06日 改訂(第3版)

Dr.sign

/


Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(day8)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/) Day8(/)

本管



Day1(/) ~ Day14(/)

《治療当日の朝より服用開始》

<p>エンドキサン錠</p> <p>★1日量 mg</p> <p>1日3回 毎食後</p>

CMF療法

標準投与量:

MTX	40 mg/m ²	day1,8
5-FU	600 mg/m ²	day1,8
CPA	100 mg/m ²	day1-14
3週毎		