

# 多発性骨髄腫に対する DBd(s.c)療法(1~3サイクル目)

(ダラキューロ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年07月19日 承認  
2022年11月09日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

【Dr必須項目】

- ダラキューロ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡


Day1( / ) Day8( / )

Day15( / )

《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナル錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため  
ポララミン錠(2) 2T

- 点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)  
本管



- 内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

※ デキサート投与終了後に皮下注

※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

Day2( / ) Day4( / )

Day5( / ) Day9( / )

Day11( / ) Day12( / )

レナデックス

★1日 mg

服用

Day1( / ) Day4( / )

Day8( / ) Day11( / )

皮下注

ボルテゾミブ mg

※ 注射部位反応に注意

DBd(s.c)療法(1~3サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day 1,8,15

Dexa 20 mg/body day 1,2,4,5,8,9,11,12

Bortezomib 1.3 mg/m<sup>2</sup> day 1,4,8,11

3週毎