

# 多発性骨髄腫に対する DBd療法(s.c)(9サイクル目以降)

(ダラキューロ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年07月19日 承認  
2022年11月09日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1 ( / )


## 《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T	
モンテルカスト錠(10) 1T	過敏反応防止のため
ポララミン錠(2) 2T	

点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス
★1日 mg
ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

## 皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 <b>1800</b> mg (15mL)
-----------------------------------

※ デキサート投与終了後に皮下注

※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

DBd(s.c)療法(9サイクル目以降)

### 標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day 1

Dexa 20 mg/body day 1

4週毎