

多発性骨髄腫に対する DKd(s.c)療法(2サイクル目)

(ダラキューロ+カイクロリス+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年7月19日 承認
2022年11月09日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/) Day8(/) Day15(/) Day22(/)


《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナル錠(500) 2T	
モンテルカスト錠(10) 1T	過敏反応防止のため
ポララミン錠(2) 2T	


皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 <u>1800</u> mg (15mL)
※ カイクロリス投与日はカイクロリス終了後に皮下注
※ カイクロリス未投与日はデキサート終了後に皮下注
※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

Day1(/) Day2(/)
Day8(/) Day9(/)
Day15(/) Day16(/)



Day22(/)



DKd(s.c)療法(2サイクル目)

標準投与量:	
Daratumumab	1800 mg/body day1,2,8,15,22
Dexa	40 mg/body/week day 1,2,8,9,15,16,22
Carfiluzomib	56 mg/m ² day 1,2,8,9,15,16
4週毎	