

# 多発性骨髄腫に対する DLd(s.c)療法(3~6サイクル目)

(ダラキューロ+レブラミド+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年07月19日 承認  
2022年11月09日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(15日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

## 内服薬

レブラミドカプセル

★1日 mg

21日間 服用

Day1( / ) Day15( / )

Day2( / ) Day8( / )

Day9( / ) Day16( / )

Day22( / ) Day23( / )

## 《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T

モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため

ポララミン錠(2) 2T

レナデックス

★1日 mg

服用

点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)

本管

側管

(60min)

生理食塩水 100mL  
デキサート6.6mg 2V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 20mg)

内服治療の場合

レナデックス

★1日 mg

ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

## 皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

※ デキサート投与終了後に皮下注

※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

DLd(s.c)療法(3~6サイクル目)

### 標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day 1,15

Dexa 20 mg/body day 1,2,8,9,15,16,22,23

Lenalido 25 mg/body day1-21

4週毎