

乳癌に対する FEC療法(5-FU+EPI+CPA)

(フルオロウラシル+ファルモルピシン+エンドキサン) (RPHW_D RPHW_)

2010年03月09日 承認
2021年11月01日 改訂(第13版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	【調製指示(2回目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1(/)


《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 100mL

側管



Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日より服用》

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

《治療翌日朝より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後)服用

Day4(/)

《朝から服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後)服用

FEC療法

標準投与量:

5-FU 500 mg/m² day1
EPI 75-100 mg/m² day1
CPA 500 mg/m² day1

3週毎